



Boletín Agroclimático de Nariño

Edición 81
abril - mayo 2026

En este boletín encontrarás:

- Predicción climática y riesgos agroclimáticos

Condiciones de lluvias (precipitaciones)
abril, mayo y junio.



- Recomendaciones agropecuarias y pecuarias

Cacao, papa, maíz, leguminosas, café,
manejo de aves, porcinos y bovinos



- Herramientas para monitorear el
comportamiento del clima.

Lluvias, temperatura, alertas de
incendios, deslizamientos, estado de
ríos.



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

AGROSAVIA



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales




Riesgos agroclimáticos

Se señalan los riesgos vigentes para el mes de marzo de 2026 para el departamento del Nariño.



Sequía



Erosión



Altas temperaturas



Plagas y enfermedades



Vientos fuertes



Exceso de lluvias



Perdida de humedad en el suelo



Incremento de humedad en el suelo



Incendios forestales



Tormentas eléctricas



Leves lluvias



Inundaciones



¡Tome medidas de prevención para cultivos, animales y de autocuidado!





Recomendaciones para el cultivo de Leguminosas

Elaboró: Segundo Coral

FENALCE, REgion Alto Andina.

- Gradualmente a medida que el suelo ha ido recibiendo el agua lluvia, él va sufriendo unos cambios tales como la disminución de los macro y micro poros; debido a la compactación que se va dando. Agudizándose más, en los casos en los cuales desde la preparación del suelo no se realizó el aflojamiento del suelo, rompiendo las capas endurecidas. El haber hecho esas labores le da al suelo mejores condiciones para poder hacer circular el agua lluvia.
- Es clave incorporar en la periferia de los lotes cultivados y dentro de ellos unos sistemas de zanjas, surcos que permitan fluir el agua que caiga en una área determinada. Un solo aguacero puede llegar a cambiar el desarrollo favorable de un cultivo.
- El control de las malezas adecuado debe iniciar desde la misma preparación de suelo, aplicaciones oportunas de herbicidas durante el desarrollo del cultivo. Se podría integrar un control de malezas en el surco de cultivo, con plantas que no sean tan agresivas entre surcos, que sirvan como amortiguadoras del impacto de las lluvias.



Recomendaciones para el cultivo de Café

CENICAFÉ

Labores de renovación germinadores y almácigos.

- **Almácigo:** Algunos germinadores establecidos en enero o febrero, para las siembras de segundo semestre del 2026 pueden tener condiciones de chapola para trasplante al almácigo, acondicione el sitio con la sombra requerida para control de humedad y disponga las bolsas con los sustratos recomendados para recibir las plántulas (AVT404).
- **Renovación:** finalice la resiembra de los sitios faltantes y la selección de chupones en los lotes renovados por zoca el semestre anterior. Recuerde aplicar un fungicida protector en la herida para evitar infecciones por la llaga macana.
- **Regule sombrío transitorio:** si tiene lotes con menos de dos años, regule la sombra para que la planta reciba la luz adecuada.

Fertilización y manejo de la acidez del suelo.

- La fertilización de los lotes de café en etapa productiva debe priorizarse, en caso tal de que no haya realizado esta labor.
- Es una época adecuada para fertilizar los lotes en crecimiento.

Manejo de plagas.

Broca (Alerta crítica): La región atraviesa un periodo crítico por el ataque de este insecto. Realizar monitoreos frecuentes para asegurar que los niveles de infestación se mantengan por debajo del 5%. Ante la necesidad de control, priorice el uso de hongos entomopatógenos (control biológico).

Minador del Café: Priorice el control biológico natural evitando el uso de insecticidas de amplio espectro. Fomente el establecimiento de arvenses nobles como refugio para enemigos naturales.



Cuarentena sanitaria en los establecimientos acuícolas ubicados dentro de la Laguna de La Cocha, municipio de Pasto, departamento de Nariño, ante la presencia de Septicemia Hemorrágica Viral-VHS

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) declaró cuarentena sanitaria en los establecimientos acuícolas de la Laguna de La Cocha, tras confirmarse la presencia de Septicemia Hemorrágica Viral (VHS).

La VHS es una enfermedad exótica en Colombia, de notificación obligatoria ante la Organización Mundial de Sanidad Animal, que afecta a más de 50 especies de peces, especialmente a la trucha arcoíris, generando alta mortalidad y posibles impactos económicos.

Entre 2024 y 2025 se detectó un aumento inusual de mortalidad en cultivos de trucha, y en diciembre de 2025 un estudio epidemiológico confirmó la enfermedad mediante pruebas de laboratorio (febrero de 2026).

Medidas principales durante la cuarentena:

- o Restricción de ingreso y salida de ovas, alevinos y trucha viva.
- o Prohibición del uso de peces muertos por enfermedad para transformación.
- o Desinfección estricta de instalaciones y equipos.
- o Implementación obligatoria de protocolos de bioseguridad.
- o Manejo adecuado de mortalidades según la autoridad ambiental.

La enfermedad no se transmite a humanos, por lo tanto, el consumo y comercialización de carne de trucha es seguro y está permitido en el país.

Mayor información: <https://www.ica.gov.co/noticias/ica-protege-produccion-trucha-cuarentena-lacocha>

¡Consume trucha con confianza!
Un alimento seguro y nutritivo.

- El virus identificado por el ICA en la laguna de La Cocha, en Nariño, no afecta la salud humana.
- Es un pescado de sabor suave, saludable y rico en proteínas.
- La comercialización está permitida a nivel nacional, sin restricciones.

¡Dale gusto a tu paladar con un buen filete de trucha!

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

www.ica.gov.co

Alerta, productor de peces

No traigas ovas de contrabando ni de origen desconocido.

No pongas en riesgo la piscicultura nacional.

La protección sanitaria de las especies acuícolas también es tu responsabilidad.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

www.ica.gov.co

